


Arts-patiënt communicatie over therapietrouw



Dr. Nicolet C.M.
Theunissen
Gynecologie

Leventhal's Zelf-regulatie ziektemodel



Relatie tussen therapietrouw en model

adult patients (n=108) using anti-hypertensives 1-10 years

- IR scales are relevant
- Relationship between IRs and adherence minimal:

Het model versus de medische praktijk

1

Patiënten voorlichting
richten op wederzijdse
gezichtspunten en
wederzijds begrip



Ziekterepresentaties

2

Patiënten voorlichting
instructies gericht op
gedrag en dagelijkse
routines



Actieplan

Ziekte representaties tijdens een regulier huisarts-hypertensiepatiënt gesprek

Patiënte: "Ik ben hier omdat ik een druk op mijn borst voel. Ik wil mijn bloeddruk laten controleren. Misschien is het omdat ik zoveel verdriet heb om de scheiding van mijn zoon."

Huisarts: [met empathie:] "Heeft u zoveel verdriet?"

Patiënte "Ach ja, ik vind het toch zo erg voor mijn zoon. Ik heb er zoveel verdriet over...."

Actieplannen tijdens een regulier huisarts-hypertensiepatiënt gesprek

Huisarts: "Hoe gaat het met de medicijnen?"


Patiënt: "Goed hoor"

Huisarts: "Prima, neemt u ook voldoende beweging?"


Patiënt: "Ik wandel heel graag"

Huisarts: "Juist, stroopt u uw mouw maar even op"


Leventhal's Zelf-regulatie ziektemodel



Onderzoeksmodel



Onderzoeksozpet




Inhoud van de HAIO training


In beide condities

- rollenspelen en video-feedback in de training
- semi-gestructureerd gespreksprotocol
- training in twee sessies van ongeveer 4 uur
- 'het kwartje valt' in de tweede sessie


Gelijken op regulier consult en waardering door patiënt




Emoties na het gesprek



Zelfvertrouwen communicatie met huisarts



Zorgen over medicatie gebruik



Conclusies

- De training levert gewenst resultaat
- Beide gesprekstechnieken uitvoerbaar
- De 'feedback loop' hypothese enigszins gesteund
- Desalnietemin: condities hadden ieder een ander effect op de Ziektereprésentaties en Actieplannen van de patiënten.
- Combinatie van gesprekstechnieken zou bruikbaar zijn
- Volgende stap: onderzoek met huisartsen ipv HAIOS
